Herbst 1887.

H 86 II

Nachtrag I

zum

Haupt-Verzeichniss

der

Baumschulen

des

Ritterguts Zöschen bei Merseburg.

Post- und Telephon-Station: **Zöschen.**

Bahnstation: **Merseburg.**

GARTENBAU-VEREIN

INHALT:

I. Laubgehölze.
II. Obstgehölze.

Der Haupt-Catalog bleibt, soweit ihn dieser Nachtrag nicht ergänzt und abändert, in voller Giltigkeit und steht Jedermann gratis zur Verfügung. Die alleingiltigen Verkaufsbedingungen sind diejenigen unseres Engros-Catalogs für 1887—88.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Vorwort.

Indem ich heute den ersten grösseren Nachtrag zu dem vor 2 Jahren erschienenen Hauptverzeichnisse hiesigen Arborets der Oeffentlichkeit übergebe, erlaube ich mir einige Bemerkungen vorauszuschicken.

Es ist in Folge der Unmöglichkeit, die mehr als 5000 hier vorhandenen Gehölzformen jederzeit in genügender Zahl zu vermehren, vorgekommen, dass unbillig denkende oder von thörichtem Concurrenzeifer befangene Menschen, denen nicht alles Gewünschte sogleich geliefert werden konnte, die durch nichts begründete Behauptung verbreiteten, dass viele der aufgeführten Gehölze hier nur auf dem Papiere vorhanden seien. Ich erkläre daher, dass die Vertheilung der Vorräthe nach nachstehenden Principien erfolgt:

1. Zuerst bedacht werden Botaniker, welche Material zu wissenschaftlichen Arbeiten bedürfen und zwar im Bedürfnissfalle ganz unentgeltlich.
2. Alsdann kommt die Reihe an die botanischen Gärten, wissenschaftlichen Institute und Sammlungen des In- und Auslandes, sowie an Privatsammler, von denen ich voraussetzen kann, dass sie wissenschaftliche Ziele verfolgen.
3. Alle übrigen Interessenten und Besteller werden nach der Reihenfolge der Aufträge mit gewohnter Coulanz und Gewissenhaftigkeit bedient, sind auch in der Lage, sich durch längere Vorausbestellung den Empfang bestimmter Gehölze zu sichern, die ja, wenn nöthig, dann rechtzeitig in Vermehrung genommen werden können.
4. Die Anlage dendrologischer Sammlungen befördere ich gern durch Sortimentslieferungen zu bedeutend herabgesetzten Preisen und kann, falls die nöthige Zeit gelassen wird, auch wohl das gesammte Sortiment geliefert werden.

Der vorliegende Nachtrag umfasst leider noch immer nicht die Gesammtheit des vorhandenen Materials, da die zur Sichtung und Zusammenstellung nöthige Zeit nicht vorhanden war, doch dürfte, abgesehen von einer Anzahl zum Theil noch unbeschriebener Novitäten, das Interessantere vollzählig aufgeführt sein. Die Gattungen *Berberis* und *Rosa*, deren Synonymie inzwischen durch neue Arbeiten stark verändert wurde und deren Bestand eine besonders reiche Zunahme erfuhr, sind in der Gesammtheit ihres hiesigen Bestandes vorgeführt, während für die übrigen Gattungen der Hauptcatalog noch mit in Geltung bleibt. Eine neue Auflage des Coniferen-Cataloges erscheint erst nächsten Herbst.

Sachliche Kritiken meiner durchaus nicht unfehlbaren Cataloge werden mir hochwillkommen sein, hämische oder tendenziöse Angriffe und Unterstellungen werden dagegen hinfort ignorirt werden.

Ich benutze diese Gelegenheit, meinen zahlreichen botanischen Freunden und Gönnern im In- und Auslande, die mich durch gütige Ueberlassung von Material thatkräftig unterstützten, hier auch öffentlich meinen herzlichen Dank abzustatten und wage ich zu hoffen, dass meine redlichen Bestrebungen in immer weiteren Kreisen Anerkennung und Unterstützung finden werden, sei es durch Zusendung von Vermehrungsmaterial seltener oder hier noch fehlender Gehölze, sei es durch Ueberweisung von Aufträgen oder durch Empfehlung in Consumentenkreisen.

Zum Schluss erkläre ich, dass die deutschen Botaniker und Gehölzfreunde, so lange der Staat seiner Ehrenpflicht, einen deutschen dendrologischen Reichs-Garten für die Bedürfnisse der Wissenschaft zu schaffen, nicht genügt haben wird, mein Institut als deutsches National-Arboretum ansehen und sich im Bedürfnissfalle vertrauensvoll an mich wenden können. Soweit meine Kräfte reichen, sind dieselben bereitwilliger Unterstützung und eventuell auch gastlicher Aufnahme sicher.

Rittergut Zoeschen-Unterhof, den 15. September 1887.

Dr. G. Dieck.

I. Laubhölzer.

		M.
	Acanthopanax *spinosum Micq. fol. var.*	1,50
	Acer *californium T. et Gr.* Wir besitzen von diesem herrlichen Eschenahorn, der bis zum Winipeg-See nach Norden verbreitet ist, jetzt Material, welches bereits 3 Winter ohne jeden Schaden überstand	1—3
	— *campestre L. var. taurica h.*	1
B?	— *carpinifolium Sieb. et Zucc.*	3—5
B?	— *crataegifolium Sieb. et Zucc.*, gleich dem vorigen eine höchst auffallende japanische Art mit länglich eiförmigen, fast ganzrandigen Blättern	3—5
B?	— *dealbatum h.* zu *polymorphum?* aus japanischem Samen erzogen	3
	— *dasycarpum Ehrh. f. lutescens h. Sp.*	1—1,50
	— „ „ *f. pulverulenta h.*	1—1,50
	— *monspessulanum L. var. iberica M. B.*	1
	— *Negundo L. f. nana h.*, interessante dichtbuschige Zwergform	1—1,50
	— „ „ *fol. aureo-marginatis Arb. Zoesch.* Neu! sehr hübsche, hier entstandene Spielart mit gelbgeränderten Blättern und stärkerem Wuchs als die weissbunte Form .	1,50—2
	— *Negundo f. angustifolia Arb. Zoesch.*	1
	— *platanoides L. f. nana h.*, zwergige Abart	1—1,50
	— „ „ „ „ *pyramidalis h.*	1—2
	— *Pseudo-Platanus L. f. longifolia h.*	0,60—1
	— „ „ „ *f. nervosa h.*	0,60—1
	— „ „ „ *f. purpurescens fol. var. h.* . . .	1—1,50
	— *tataricum L. f. nana h. Zoesch.*, hier entstandene Zwergform, die, hochstämmig veredelt, schöne Kugelbäume liefert. Neu! niedrig 2 *M.* Hochstämme	3
B?	— *trifidum Hook. et Arn.*, aus japanischem Samen! noch nicht in den deutschen Gärten	3—4
	Aesculus *Hippocastanum L. f. Mauroyi h.*	1,50
	— „ *f. pyramidalis h.*	1,50
	— *Pavia* × *lutea* = *Withleyi h.*	1
	— „ *f. Lindleyana Spach.*	1
	— „ *f. praecox h.*	1
	Ailantus *glaudulosa Desf. f. pendulifolia h.*, eine neue, sehr auffallende Form mit hängenden Blättern	3
	Akebia *quinata Dcne. flore roseo.*	1,50
	Alnus *autumnalis.* Wir erzogen aus unter diesem Namen erhaltenen Samen eine der *A. incana* nahestehende Erle, deren junge Triebe sehr auffallend fuchsroth gefärbt sind	1
	— *cordata* × *barbata Arb. Zoesch.*, hier gezogener interessanter Bastard. Neu!	2,50
	— *incana L. f. monstrosa h. Sp.*, sehr auffallende Form .	1,50
	— „ *f. sibirica h.*	1
	— „ *var. sericea Chr.*, hochalpine Form	1
	— „ „ „ *sorbifolia h.*	1
	— „ „ „ *pubescens Sart.*	1
	— „ „ „ *plicata h.*	1
	— *subcordata C. et M. f. orientalis Dcne*	1
	— *oblongata Mill. f. denticulata h.*	1
	Amelanchier *canadensis L. f. macrocarpa h. b. Petr.*	0,60

		ℳ
	Amorpha *fruticosa L. f. pendula h.* Zweige überhängend .	1
	— „ *A. f. Arcansana h.*	0,50
	Amygdalus *cochinchinensis h.* (*nec. Lour.*)	1—1,50
B?	— *communis fl. pl.*, prächtig gefülltblühend	1—1,50
B?	— „ *fl. albo pleno*, gefülltblühend	1—1,50
	— *hiemalis h.*	1
	— *Persica L. f. nana h.* von kugeligem Bau! für Topfkultur	3
	— „ „ *f. pyramidalis h.*	1—1,50
	Andromeda *polifolia L. f. lavendulaefolia h.*	1,50
	— „ *f. rosmarinifolia Prsh.*	1,50
	Artemisia *spec. suffruticosa h. b. Petr.*, diese höchst zierlich belaubte, strauchige, mongolische *Artemisia* erzogen wir aus Samen, den wir vom bot. Garten zu Petersburg erhielten	2,50
B	**Arundinaria** *falcata Nees.*	2
B	**Atriplex** *occidentalis*, diese hübsche, verholzende Art, die wir von Dr. Bolle erhielten, scheint härter und schöner zu sein als *A. halimus*	0,75
	Atraphaxis *lanceolata Meissn.*	3
	— *spinosa L.*, interessante Wüstensträucher schwieriger Kultur	3
B	**Bambusa** *mitis Lour. f. aurea Sieb.*	1,50
B	— *violascens h.*	1,50
B	— *gracilis h.*	1,50
B	— *glauca Lodd.*	1,50
B	— *Quihoni h.*	1,50
B	— *Simonii Carr. h.*	1,50
B	**Berberidopsis** *corallina Hook.* Dieser reizende Blüthenstrauch der Gebirge Chiles hat hier schon zwei Winter unter schwacher Decke gut ausgehalten und verdient daher Anpflanzung	2
B	**Berberis** *actinacantha Mart.* (?)	1
B	— *aetnensis Prsl.*	1,50
B?	— *aristata D. C.*	1
B?	— „ *var. Chitria Ham.*	1
B?	— „ „ *serratifolia Poir.*	1
	— *asiatica Roxb.*	0,75
B?	— *buxifolia Lam.* = *dulcis Sweet*	0,40
B?	— „ *f. minima h. S. L.* } reizende, immergrüne Zwergbüsche	1—2
B?	— „ *f. nana h. S. L.* } reizende, immergrüne Zwergbüsche	1—2
B?	— „ *f. pygmaea h. S. L.* } reizende, immergrüne Zwergbüsche	1—2
	— *concinna Hook.*	1,50
B	— *Darwini Hook.*	0,50—1
B?	— *Darwini* × *empetrifolia* = *stenophylla h. angl.*	0,75
B	— *empetrifolia Lam.*	1,50
	— *floribunda Wall.* = *ceratophylla Don.*	1,50
B	— „ *var. umbellata Lindl.*	1
	— „ *f. elegans Desf.*	0,60
	— „ *f. Nepalensis Lodd.* (= *tinctoria Lesch.?*) . .	0,60
	— „ *f. fuchsioides h.*	0,60
	— *heteropoda Schrank.*, blaufrüchtiger, turkestan. Sauerdorn	0,50
	— „ *fructibus globosis h. b. Petr.*	0,75
	— „ „ *oblongis nigris h. b. Petr.*	0,75
B	— *Hookeri h. angl.* aus Chile, halbimmergrün	1,50
	— *integerrima Bge.*, rothfrüchtiger, turkestan. Sauerdorn .	0,60
	— „ *baccis pallide rubris h. bot. Petr.*	0,75
	— „ *baccis saturate rubris h. bot. Petr.* . . .	0,75
	— „ *baccis oblongis rubris h. bot. Petr.* . . .	0,75
B	— *Lycium Royle*, halbimmergrün, schön	1
B	— „ *var. Jamesonii h.*, vielleicht auch zu *Hookeri!* .	1,50
	— *serotina Lge.*, hübsche Neuheit, vom Autor uns freundlichst mitgeteilt!	1,50
	— *sinensis Desf.* (*teste Burmeister*), diese prächtige Art, welche wir durch den Berliner bot. Garten erhielten colorirt im Herbst prächtig roth und scheint der *B. sin. v. angustifolia Rgl.* zu entsprechen!	1,50—2
	— *sinensis var. canadensis Pursh.* = *caroliniana Loud.* .	0,50

		ℳ
	Berberis *sinen. var. canadensis f. provincialis Schrad.*	0,75
	— „ „ *f. cerasina Schrad.*	0,60
	— „ *var. crataegina Rgl. = iberica Stev.*	0,75
	— „ „ *f. glaucescens C. Koch.*	0,75
	— „ *var. cretica Rgl.*, echt	1,50
	— „ ? *f. microphylla serrata h.*	1,50
	— „ *var. petiolaris Wall.*	1
	— „ *var. sanguinolenta Schrad.*	0,60
	— „ *var. spathulata Schrad.*	0,60
	— *Thunbergii DC.*, prächt. in Belaubg., Frucht u. Herbstcolorit	1
	— *Thunbergii var. uniflora Arb. Zoesch.*, Blüthen stets einzeln.	1,50
	— „ *f. macrocarpa Arb. Zoesch.*, mit grösseren Früchten und daher besonders zierend	1,50
	— *vulgaris L.*, gemeiner Sauerdorn	0,10
	— „ *var. arborescens C. Koch. = Lycium h. = Nepalensis h.*	0,60
	— *vulgaris var. arborescens f. laxiflora Schrad.*	0,50
	— „ *v. amurensis Rgl.*, vom Autor erhalten	0,80
	— „ *v. angulizans h.*	1
	— „ *f. atropurpurea h.*, bekannter rothblättriger Prachtstrauch	0,30
	— *vulgaris var. brachybotrys Edgew. (sinensis h. ex parte)*	0,75
	— „ *f. coriacea h.*	0,50
	— „ *f. declinata h.*	0,50
	— „ *f. edulis h.*	0,60
	— „ *f. foliis aureo-marginatus h.*	1
	— „ *f. foliis pulverulentis Arb. Zoesch.*	1
	— „ *f. foliis variegatis h.*	1
	— „ *f. flore gracili h.*	0,60
	— „ *f. fructu albo h.*	0,75
	— „ *f. fructu nigro h.*	0,75
	— „ *f. globularis*	0,60
	— „ *f. ilicifolia h.*	0,60
	— „ *f. lucida h.*	0,60
	— „ *f. macrophylla h.*	0,75
	— „ *f. marginata Schrad.*	0,60
	— „ *f. monosperma h.*	0,60
	— „ *f. nigra h.*	0,60
	— „ *f. nitens h.*	0,60
	— „ *var. parvifolia Rgl. = cretica h.*	0,60
	— „ *var. spicata h.*	1
	— „ *var. sulcata C. Koch = heterophylla h. bot. Berol.*	0,75
	— „ „ *f. emarginata h.*	0,75
	— „ × *caroliniana (?) = Jacquini Schrad.*	0,75
B?	— *Wallichiana DC.?*, der *B. buxifolia* ähnlich, aber grösser.	1
	Betula *alba v. carpathica W. et K.*	1
	— „ *var. pontica Desf.*	1
	— „ *f. glandulosa h.*	1
	— *dahurica Pall.*	1
	— *humilis Schrk. v. Soccolovii Jacq. f.*	1
	— „ „ *var. palustris Rupr.*	1
	— *lutea Michx. f. persicifolia h.*, sehr schön	1,50
	— *nana L. v. canadensis h.*	1
	— *papyracea Ait. f. amygdalifolia h.*	1
	— „ „ *f. pirifolia h.*	1
	— *pendula Arth. f. verrucosa h.*	1
	— „ „ *f. cuspidata h.*	1
	Bignonia *L. Bignoniaceae*, Trompetenblume	
BB	— *capreolata L.*	1
B?	**Broussonetia** *papyrifera Vent. f. macrophylla h.*, prachtvoll![1]	1—2
B?	**Buddleya** *globosa Lam. angustifolia Arb. Zoesch.*, hier entstandene hübsche Form mit viel schmäleren Blättern	1

[1]) Eine der ornamentalsten Solitairpflanzen, vorzüglich wenn dieselbe, um üppige Triebe zu erzielen, alljährlich heruntergeschnitten wird.

		ℳ
B	**Bridgesia** *spicata Hook.*, immergrün kriechend	1
	Buxus *sempervirens L. f. longifolia h.*	
	— „ *f. salicifolia h.*	
	— „ *f. navicularis h.*	
	— „ *f. macrophylla rotundifolia h.*	0,50—1,50
	— „ *f. pyramidalis*	
	— „ „ *variegata*	
B	— *Balearica Willd.*	1
B?	— *longifolia Boiss.* = *B. Fortunei longifolia h.*	1—1,50
B?	— *microphylla S. et Z. v. rotundifolia h.*	1—1,50
	Calluna *vulgaris L. v. Foxii h. angl.*	
	— „ „ *v. Handsworthii h. angl.*	0,50—0,75
	— „ „ *v. Reginae h.*	
	Calophaca *grandiflora Rgl.* Interessante Neuheit aus Turkestan durch den Petersburger bot. Garten (Dr. Regel) erhalten. Noch nicht im deutschen Handel	1,50
	Calycanthus *floridus L. oblongifolius h.*	1
	— „ *longifolius h.*	1
	— „ *pennsylvanicus Lodd.*	1
	Caragana *arborescens Lam. f. macrophylla h.*	0,60
	— „ „ *foliis pulverulent. Arb. Zoesch.* neu!	1
	Caryopteris *mastacanthus Schauer.*, hübsch belaubter Halbstrauch aus Neuseeland. Neu!	2
B	**Catalpa** *nana h. bat.*, eine zärtliche Zwergform	1,50
	— *himalaica h. gall.* von *Wallichiana* kaum verschieden. Beide werden übrigens zu *C. Kaempheri* und nach Ost-Asien gehören, da nach der ganz neuen *Flora indica* die Gattung *Catalpa* im Himalaia ganz fehlt	1,50
BB	**Ceanothus** *Hartwegii h. Kew.*	1,50
B?	— *sanguineus Pursh.*	1,50
B?	— *thyrsiflorus Eschsch.*	1
B?	— *velutinus Dougl.*	1,50
B?	— *Delileanus h. bot. Petr.* (= *Dillenianus h.?*)	0,80
	— *americanus L. f. Albert Pittet*	0,80
	— „ „ *Aether*	0,80
	— „ *var. Fontanesianus Spach.* = *ovatus Desf.*	0,50
	— „ *f. sceptre d'azur*	0,80
B?	— „ *f. prostrata?*	0,50
	Celtis *Bungeana Blme.* = *chinensis Bge.*	1
B	— *australis L. fol. variegatis h.*	1,50
	Chionanthus *virginica L. pubescens h.*	1,50
	— „ *montana h.*	1,50
	Centrosema *Benth. Papilionaceae?*	
B	— *virginiana, Benth.*, kleiner zarter Schlingstrauch	1,50
	Clematis *alpina Mill. var. sibirica Rgl.* (*Atragene*)	1,50
B	— *cirrhosa L.*	1
	— *florida Thbg. v. pallida h.*	1
	— *glauca Willd.*	0,50
	— *lanuginosa Lindl. v. nivea h.*	1
	— *lathyrifolia Rchb.*	1
	— *paniculata Thbg.*	1
	— *intricata* aus mongolischem Samen erzogen, den wir wie den der folgenden Art dem Petersburger bot. Garten verdanken	1
	— *sp. mongolica*	1
	Clethra *alnifolia L. v. tomentosa Lam.*	1—1,50
	— „ „ *scabra Pers.*	1
	Colutea *arborescens L. f. crispa h.* = *pygmaea hort. nonn.*	1
	— *Nepalensis h.*	0,60
	— *brevialata Lge.*, neue, der *C. media* ähnliche Art aus Südfrankreich, vom Autor uns gütigst mitgeteilt	1
	— *orientalis Mill.*, die echte Art, während wir früher gleich anderen Baumschulen Formen der *C. media* für *orientalis* hielten und versandten. Sehr hübsch	1

		ℳ.
	Cornidia *Hook. et Arn. Saxifragaceae?*	
B?	— *integerrima Hook. et Arn.*	1,50
	Cornus *australis C. A. M.* = *C. ignorata C. Koch?* . . .	0,75
	— *candidissima Mill. v. oblongata h.*	0,75
	— *mas L. v. crispa h.*	1
	— *stolonifera Mchx.* (*alba*) *v. tricolor h.* Eine alte, wenig bekannte, panaschirte Abart des weissfrüchtigen amerikan. Hartriegels, welche, nach Zweigen verteilt, alle seither benannten bunten Formen (incl. *C. alba Spaethii Wittm.*) vereinigt	1,50
	Cornus *Nuttalli And.*, der Vertreter unseres *C. mas.* in Nordwestamerika, noch sehr selten in Europa	1,50
	Corylus *colurna L. v. pyramidalis h.*	1,50
	— *mandschurica Maxim.* soll die asiatische Form der nordamerikanischen *Corylus rostrata* sein	1,50
	Corothamnus *decumbens Walp* (1786) = *Halleri Regn.* (1788) .	0,80
B?	**Cotoneaster** *disticha Lge.*, neu! vom Autor gütigst mitgeteilt .	1,50
	— *borealis h.*	0,80
B?	— *frigida Wall.*	1
B?	— *Hookeri h. S. L.*	0,80
B?	— *himalaiensis h.*	0,80
B?	— *montana Lge.*, neu! vom Autor gütigst mitgeteilt . .	1,50
	— *nummularia F. et M. v. orbiculata Wenz.* = *Royleana h.* .	0,80
B	— *obtusa Wall. f. bacillaris Wall.* aus dem bot. Garten zu Coimbra	1
B	— *thymifolia h.*	0,60
	Cytisus *hirsutus L. var. falcata W. et K.*	0,60
	— „ *v. polytricha M. B.*	0,60
	— „ *f. uralensis h.*	0,60
	— *Ratisbonnensis Schaeff. f. biflora l'Her. f.*	0,80—1
	— „ *var. Rhutenica Fisch.*	0,60
	— „ „ „ „ *f. glabrata h.* . .	0,60
B	**Daboecia** *cantabrica Huds. v. grandiflora h.*	1,25
B?	— *globularis Hook.*, nordamerikanische Art, noch sehr selten	1,50
	Daphne *alpina L.*	2
	— *caucasica Pall.* = *salicifolia Lour.*	2,50
	cneorum L. f. maxima h.	2
	— *collina Lm.* (1772) = *sericea Vahl* (1790)	2
	— *japonica Paxt.*	2
	— *Laureola L. f. purpurea h.*	3
	Deutzia *gracilis S. et Z. foliis medio pictis h.*	0,75
	Diervilla *hortensis S. et Z. f. nivea aurea h.*, schöne Neuzüchtung	0,75
	— *hybrida h. f. Jean Macé h.*	0,60
	— „ *f. Othello h.*	0,60
	— „ *f. Abel Carriere h.*	0,60
	— „ *f. Dr. Baillon h.*	0,60
	— „ *f. John Standish h.*	0,60
	— „ *f. John Wither h.*	0,60
	— „ *f. Madame van Houtte h.*	0,60
	— „ *f. Pecheur fils h.*	0,60
	— „ *f. Voltaire h.*	0,60
	— *rosea Lindl. Augusta h.*	0,50
	— „ *longifolia foliis argenteo-marginatis h.* .	0,60
	Dryas *lanata Kern.*	1
	— *octopetala L. f. minor. h.*	1
	Eleagnus *augustifolia L. elliptica h.*, aus turkestanischem Samen	0,75
	— „ *f. hortensis h.*	0,75
	— „ *f. latifolia h.*	0,75
	— „ *f. microcarpa h.*	0,75
	— „ *f. rotundifolia h.*	0,75
B	— *japonica h.*	1
B	— *macrophylla Thunb.*	1
	— *macrocarpa h.*	0,75

		M.
	Escallonia *Mut. Ribesiaceae*	
BB	— *Philipiana Mast.*	1
BB	— *rubra Pers.*	1
BB	— *sanguinea*	1
	Erica *carnea L. f. coccinea h.*	0,50—0,75
	— *multiflora Huds. f. grandiflora h.*	0,50—0,75
	— *Tetralix L. f. canescens h.*	0,50—0,75
	— *vagans L. f. alba*	0,50—0,75
	Eriogonum *umbellatum Torr.*	1
	Evonymus *europaea L. fructu albo h.*	0,80
	— „ *pannonica Gaertn.*	0,60
	— „ *nana h.*, dichtbuschige Zwergform, sehr selten	1
	— *nana M. B. f. turkestanica h.*, üppiger und grossblättriger als *nana*	0,60
	Fagus *sylvatica L. macrophylla h.*	0,80—1,50
	— „ *nana h.*	0,80—1,50
	— „ *foliis aureis h.*	0,80—1,50
	— „ *pyramidalis h.*	0,80—1,50
	— „ *Remillyensis h.*	0,80—1,50
	— „ *retroflexa*	0,80—1,50
	— „ *tortuosa h.*	0,80—1,50
	Fendlera *Gray. (?) Saxifragaceae (?)*	
B	— *rupicola Gray.*, zarter Felsenhalbstrauch	2
B?	**Ficus** *hirta Roxb.*, härter als die gemeine Feige, Vaterland Japan!	5
	Forestiera *Poir. Oleaceae*	2,50
B	— *acuminata Poir.* Dieses feine Gehölz, welches aus unseren Culturen verschwunden schien, ist von Prof. Dippel wieder aufgefunden und mir gütigst mitgetheilt worden	
B	— *numidica?* = fr. des monts kabyles h. gall. neu!	
B	**Fraxinus** *dimorpha Coss. f. dumosa h.* äusserst zierlich	1—1,50
	— *excelsior h. f. heterophylla variegata h.*	0,80
	— „ *f. jaspidea h.*	0,80
	— „ *f. Transoni h.* mitunter gelbbunt	0,75
	— *oxycarpa* Willd. *f. lyrata h.*	0,80
	— „ × *excelsior* = *lucida h. angl. (?).* Mit diesem Namen bezeichnete mir Prof. Dippel eine Esche, welche ich der Güte des Herrn Ilsemann-Ungar-Altenburg verdanke. Dieselbe ist augenscheinlichst Bastardform und ihre schmalen glänzendgrünen Fiederblätter coloriren im Herbst purpurbraun. Eine Pracht-Esche!	1,50
	— *parvifolia monophylla Arb. Zoesch. v. laciniata Arb. Zoesch.*, diese neu von uns aus Samen gezogene Form entspricht der geschlitztblättrigen *F. excelsior monophylla* als Parallelform	2—3
	— *parvifolia* × *excelsior monophylla* = *Veltheimii Arb. Zoesch* Eine gleichzeitig mit der *parvifolia monophylla* erzielte Form, welche gleich dieser aus Samen erwuchs, den mir Herr Hofjägermeister von Veltheim aus seinem an alten, schönen Bäumen so reichen Parke zu Destedt gütigst überliess. Diese Form unterscheidet sich durch helleres Holz dünne, überhängende Nebenäste und besonders auf der Unterseite sehr rauhbehaarte Blätter. Sie reproducirt im Gegensatz zu ersterer, welche wie *Fr. excelsior* aufrecht wächst, den eleganteren Habitus der *parvifolia*	3—5
	— *raibocarpa Rgl.* Eine neue centralasiatische Art, die, durch sichelförmige Früchte ausgezeichnet, mir vom Autor zur Verbreitung gütigst überlassen wurde	2
BB	**Garrya** *laurifolia Benth (?)*	2
BB	— *latifolia h. (= macrophylla Benth?)*	2
BB	— *Mac Fadyi (= Fadyenii Hook?)*	2
BB	— *Fremonti Torr.* Alle vier scheinen nicht erheblich weichlicher zu sein als *G. elliptica,* sind also für geschützte Lage brauchbar	2

		M.
	Genista *anglica L.* echt! von Dr. O. W. Focke erhalten . .	1
B	— *aetnensis DC.*	1
B	— *polygalaefolia DC.*	0,60
	Gleditschia *inermis Mill. v. monosperma Walt.*	1
	— *macracantha Desf.*	1
	— „ *f. ferox Desf.*	1
	— „ *f. Fontanesii Spach.*	1
	— *Triacanthos L. v. latifolia h.*	1
B	**Hamamelis** *arborea Sieb.*	2,50
	Haplophyllum *Bge.*	
	— *lasianthum Bge.* centralasiatischer Wüstenstrauch . .	3
	Hedera *Helix L. f. cordata h.*	0,60
	— „ *f. dentata h.*	0,60
	— „ *var. Donerailensis h.*	1
B	— „ *var. hibernica f. maculata major h.* . .	0,75
B	— „ „ *f. marginata h.*	0,75
B	— „ „ *f. purpurea h.*	0,75
	— „ *f. Mistress Pollok h.*	1
	— „ *rhomboida h.*	0,75
	Helianthemum *Fumana Mill.*	0,40
	— „ *f. major h.*	0,60
	— *pilosum L. v. appeninum Gaudin*	0,40
	— „ *f. grandiflora h.*	0,40
	— „ *f. rotundifolia h.*	0,40
	— „ *f. Rhodax h.*	0,40
	— „ *f. rubescens h.* sehr schön	0,60
	Helichrysum *G. Gnaphaliaceae*	
B	— *italicum Guss.*	0,60
	Hibiscus *syriacus L. f. alba plena h.*	
	— „ *f. ardens h.*	
	— „ *f. duc de Bretagne h.*	0,60—0,75
	— „ *f. pompon blanc*	
	— „ *f. praecox fl. pl.*	
	— „ *f. serotina = très tardif. h. gall.* . . .	
B	**Hydrangea** *opuloides Lam. f. floribunda h.*	
B	— „ *f. foliis tricoloribus h.*	
B	— „ *f. Kaiserin Elisabeth h.*	
B	— „ *f. Lindleyi h.*	0,60—0,75
B	— „ *f. Mad. v. Siebold h.*	
B	— „ *f. macrocephala h. (macroph. Rgl.?)* . .	
B	— „ *f. rosalba h.*	
	— *serrata Th. persicifolia h.*	
	Hymenanthera *Hook Oleaceae?*	
B	— *crassifolia Hook.*, immergrüner Zwergstrauch aus Neuseeland	2
B?	**Hypericum** *Decaisneanum*, eine der zierlichsten und schönsten Arten, besonders auch in der Blüthe	0,75
B?	— *empetrifolium W.* hat die zierlichste, an die von Empetrum erinnernde Belaubung	0,75
	— *elatum Ait. grandiflorum h.*	0,50
	— *japonicum Thunb.*, schön und hochwachsend aber staudenartig	0,30
	— *japonicum f. macrophylla*	0,40
B?	— *multiflorum Sieb.*	0,50
B?	— *salicifolium Sieb. u. Zucc.*	1
B?	**Iberis** *Tenoreana DC. v. petraea Jord.*	0,60
B	**Indigofera** *pulchella Roxb. v. major C. Koch = Royleih.* .	
B	— *floribunda h.*	
BB	**Illicium** *floridanum Ell.*	
BB	— *religiosum Sieb. et Ducc.*	
	Ilex *aquifolium L. v. laurifolia h.* Die schönste für Binderei	1—3
B	— *crenata Thunb.*	
B	— „ *var. Fortunei h.*	2—3
B	— „ *foliis variegatis h.*	

		M.
	Ilex *Dahon Wall. var. myrtifolia Wall.*	
B	— *dipyrena Wall.*	
B	— *japonica? v. rotundifoliä h.* (= *rotunda Thunb?*)	2—3
B	— *latifolia Thunb. v. Torajo Sieb.*	
B	— *quercifolia Meerb. v. contorta h.*	
B	— *ovata Göpp*	
BB	**Jasminum** *albiflorum h.*	1
BB	— *humile L. foliis variegatis h.*	1
B	— „ *Lindl., var. Reveesii* vielleicht auch zu *J. floridum*	0,80
BB	— *officinale L., foliis variegatis h.*	0,80
BB	— *Wallichianum Hook?* Den Samen dieser zierlichen Art vom Himalaia verdanken wir dem Royal-Garten zu Kew	1
	Juglans *macrophylla h.* zu *Sieboldiana Max?*	2—3
	Kadsura *Kampf. Schizandraceae*	
	— *japonica Dim.*	1
B	**Kalmia** *angustifolia L. v. serotina h.*	1
	— *latifolia L. v. alba h.*	1,50
B	**Lagerströmia** *L. Lythrariaceae*	
	— *indica L.,* schöne aber sehr zarte Schlingpflanze	1,50
BB	**Lespedeza** *macrocarpa Bge.* (= *Campylotropis chinensis Rgl.*)	
B?	dem *Desmod. penduliflorum* sehr ähnlich	1,50
	Ligustrum *compactum Thomas et Hook.* (*japonicum Thunb.*)	
B	*var. longifolia h.*	1
	— *japonicum Thunb. var. tricolor*	1
BB	— *ilicifolium h.*	1
BB	— *Nepalense Wall.* (?)	1
B	**Liriodendron** *tulipifera L. var. fastigiata h.*	1,50
	Lithospermum *Tourn. Borragineae*	
	— *fruticosum L.*	0,80
	Lonicera (*Caprif.*) *ciliosa Poir.*	1
	— *caprifolium L. v. dimorpha h.*	0,60
	— „ „ *f. italica h.*	0,60
	— „ „ *f. Magnevillei*	0,60
	— „ „ *f. pallida h.*	0,60
	— *glauca h.* zu *paroiflora?*	0,60
	— *Goldii h. nec. Sprgl.,* sehr schön goldgelb blühend	0,80
	— *parviflora Lam.*	0,60
	— *sempervirens L. var. superba h.*	0,60
	— (*Xylost.*) *diversifolia Wall. echt!*	1
	— „ *caerulea L. var. dependens Rgl.* vom Autor erhalten	0,80
	— (*Xylost.*) *caerulea var. glabriuscula Rgl.*	0,80
	— „ „ „ *salicifolia h.*	0,80
	— „ „ „ *Solonis*	1
	— „ „ „ *sphaerocarpa h.*	0,80
	— „ *floribunda Boiss. et Bhse.,* seltene nordpersische Art	1,50
	— „ *flavescens = Webbiana hort. nonn.*	1,50
	— „ *gibbiflora h. = tatarica ×?*	0,60
	— „ *iberica Bieb. v. microphylla h.*	0,60
	— „ *parviflora h. v. Houtte,* sehr interessante, vielleicht neue Art	1
	— „ *nigra L. f. pyrenaica h.*	0,80
	— „ *Xylosteum L. v. pseudochrysantha h. b. Ber.*	0,80
	Lycium[1]) *chinense L. f. typica*	0,30
	— „ *L. var. lanceolata Poir. = megistocarpum Dun.*	0,30
	— *halimifolium Mill.* (*Dippel*)	0,60
B?	— *europaeum L.* echt! mit Massen ganz kleiner erbsenförmiger rother Früchte bedeckt	0,60
	— *rhombifolum Mnch.* (*Dippel*)	0,60
	— „ „ zwergig wachsende Form mit sehr grossen gurkenförmigen Früchten	0,75
	— *ruthenicum Murr.* echt! Durch die fleischigen Blätter sehr abweichend und in den Gärten höchst selten geworden	1

[1]) Unsere *Lycium* sind durch Prof. Dippel-Darmstadt freundl. durchgesehen worden.

	ℳ
Lycium *turcomanicum*, noch sehr selten, aus Samen gezogen, welche wir aus dem Petersburger Garten erhielten . .	1
Leucothoë (*Lyonia*) *acuminata Desv, f. populifolia Lam.* . .	1,50
— „ *Hendorsonii h.*	1,50
Magnolia *Fraseri Walt.*	2—4
— *obovata Thbg. var. cordala h.*	2—4
— „ „ „ *rustica h.*	2—4
— *Yulan Desf. f. speciosa h.*	2—5
Mahonia *Ehrenbergii Kze.*	3
— *juglandifolia h.*	3
Mespilus *arborescens h.*	
— *Azarolus L.*	0,60—1
— „ *fructu rubro*	0,60—1
— „ *olivacea h.* sehr grossfrüchtig	0,75—1,50
— *Celsiana Bocc.* echt! von Prof. Lange, Kopenhagen.	0,75—1
— *coccinea Mill. var. mollis h.* sehr breitblättrig, ziegelroth austreibend, und daher sehr zierend.	Sämmtliche Mespilus-Arten ohne Preisangabe je nach Stärke der Pflanzen à 0,50—1 ℳ.
— *coccinea f. eriocarpa DC.*	
— „ *f. elliptica h.*	
— „ *f. Kielmanni h.*	
— „ *f. Smithii h.* (zu *grandiflora?*)	
— *Crusgalli L. f. lobata h.*	
— „ *f. longispina h.*	
— „ *f. prunifolia Bosc.?*	
— „ *var. splendens f. longispina h.*	
— „ *f. Watsoniana Spach* (= *pyracanthifolia*-Ait)	
— *cuneata S. et Z. alnifolia* (*Zucc. et Sieb.* = *atropurpurea Lavallé?*)	
— *flava Ait.*	
— *grandiflora Lm. f. lobata Poir.*	
— *germanica L. f. macrophylla h.*	
— *glandulosa Mnch. V. f. macracantha Lindl.*	
— *hiemalis Lge.* neue, vom Autor gütigst mitgeteilte Art. .	1—2
B? — *mexicana Moç. et Sessé*	0,75—1,50
B? — „ *f. Oliveriana h.*	0,75—1,50
B? — „ *f. Lambertiana h.* Sämmtliche Formen des halbimmergrünen mexikanischen Dorns sind sehr schön und zeigten bisher kaum Winterschäden.	0,75—1,50
— *monogyna Jacq. f. corallina h.*	Sämmtl. Mespilus-Formen ohne Preisangabe kosten je nach Stück 0,50—1 ℳ.
— „ „ *f. cuneata h.*	
— „ „ *f. fastigiata fl. rubro h.*, Pyramiden Rothdorn.	
— „ „ *f. flore pleno bicolori h.*	
— „ „ *f. fructu atropureo h.*	
— „ „ *f. fructu luteo h.*	
— „ „ *f. glomerata h.*	
— „ „ *f. Maroccana h.*	
— „ „ *f. quercifolia h.*	
— „ „ *f. Zaboon h.*	
— *nigra W. et K.* (?) *f. heterophylla h.*	
— *oxyacantha L. var. auricularis Lge.* sehr hübsche Blattvarietät, vom Autor gütigst eingesandt .	0,75—1,50
— „ *f. brevispina h.*	
— „ *f. obtusata h.*	
—*pectinata Bosc.?* ist samenbeständig und daher wohl eine gute, von *monogyna* verschiedene Art.	
— *pentagyna Kit. f. amurensis h.*	
— *pinnatiloba Lge.*, sehr hübsche neue Art, vom Auotr erhalten	0,75—1,50
— *pinnatifida Bge. f. californica h.*	
— „ „ *f. chinensis Steud.*	
— *prunifolia Poir. foliis variegatis h.*	
— *punctata Ait. f. badiata h.* (? zu *galli?*)	
— „ „ *f. cuncrusifolia.*	

		M.
	Mespilus punctata f. ingestria h.	
	— „ f. maliformis h.	
	— „ f. piriformis h.	
	— „ f. odorata h.	
	— „ f. turbinata h.	
	— rubronervis Lge. neue, vom Autor gütigst mitgeteilte Art, die sehr stark und schlankwüchsig ist	0,75—1,50
	— sanguinea Poll. f. altaica h.	
	— sorbifolia Lge. neue, vom Autor gütigst mitgeteilte Art	0,75—1,50
	— ? cerasina h., ältere Gartenform, die vielleicht hierher gehört	
	— splendens Lge. (glandulosae forma?).	
	— tomentosa L. f. stipulacca h.	
	Microglosa DC. Compositae	
B	— albescens Benth. Die einzige verholzende Aster, welche hier leidlich aushält	0,60
	Mühlenbeckia Meisn. Polygonaceae	
BB	— adpressa h.	0,60
BB	— complexa Meisn., beides sehr zierliche, kriechende Gehölze	0,60
	Morus alba L. v. fastigiata h.	1,50
B	— „ „ „ Gasparini h.	1
B	— „ „ „ Towkna Sieb.	1
	— rubra L. f. caroliniana h.	
	Nandina Thunb. Berberidaceae	
B	— domestica Thunb.	2
B	— „ f. atropurpurea	2,50
B	— „ denudata Lavall. = japonica h.	2,50
	Die Nandina sind immergrüne, den Mahonien nahestehende Stäucher (deren äusserst zierliche Blätter ein vorzügliches Bouquetmaterial liefern	
BB	**Olea** aquifolium S. et Z. var. latifolia h.	2
BB	— „ „ „ rotundifolia h.	2
	Olearia Moench. Compositae	
B	— Haastii Hook., sehr hübscher immergrüner Zwergstrauch aus Neuseeland	1,50
	Opuntia Mill. Cacteae	
B	— arborescens	1
	— brachyarthra Engelm.	1
	— comanchica Engelm.	1
	— humilis Haw.	1
	— Missouriensis DC.	1
	— nana Vis.	1
	— Rafinesquiana Engelm.	0,60
	Oxydendrum CO. Ericaceae	
	— arboreum DC.	1,50
	Philadelphus coronarius L. var. nana cochleata h.	0,80
	— „ var. multiflora plena h.	0,80
	— Gordonianus Lindl. var. compacta Lge. neu	1
	— „ × hirsutus	1
	— pubescens Lois. v. nivalis f. suplena h.	0,80
B	**Phlomis** fruticosa L. var. angustifolia h.	1
B	— „ „ tricolor h.	1
	Pipthantus Sweet. Caesalpiniaceae	
B	— Nepalensis D. Don.	1
	Photinia Lindl. Pomaceae	
B	— crenata h.	1
B	— dentata h. = serrulata Lindl. var.?	1
B	— villosa DC.	1
	Pirus. a) **Birnbäume.**	
	— amygdaliformis Vill. f. oleaefolia h.	0,80
B?	— longipes Coss. et Durien sehr seltene algerische Art	2
	— nivalis Jacq. f. sinaica Thouin.	0,80
	— heterophylla Steudel. Diese interessante Art, in der wir früher die Pirus Pashia Ham. vermutheten, hat mit letzterer nichts zu thun und hat der Name daher Priorität vor heterophylla Rgl. et Schmalh	1

	ℳ
Pirus *communis L. var. cuneata h.*	0,60
— „ „ *nana h.*	0,60
— „ „ *odorata h.*	0,60

Pirus. b) Aepfelbäume.

— *baccata L. flore roseo pleno h.*	
— „ *f. Jenensis h.*	0,50—1
— „ *f. Rotomagensis h.*	
— „ *f. rubellina h.*	
— ? *f. the Fairy h. am.*	0,60—1
— *Halliana*	2—3

Diese unstreitig schönste Pirus-Art steht zwischen *P. angustifolia Ait.* und *rivularis Dougl.* und zeichnet sich durch eine tiefdunkelgrüne, durch rothe Triebspitzen noch gehobene Farbe der mitunter halbimmergrünen Belaubung, herrliche Blüthen von incarnatrosa Färbung und winzige, dem des *P. rivularis* ähnelnde Früchte aus. Es war uns unmöglich, Autor und Vaterland zu ermitteln, glauben aber, dass der Baum aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten stammt und von einem amerikanischen Autor nach dem Botaniker Elihu Hall, der in diesen Gegenden viel sammelte, benannt wurde.

— *Malus L. var. armeniacaefolia h.*	
— „ *var. chinensis flore pleno h.*	
— „ *flore albo (semipleno) h.*	
— „ *f. cortice fungoso h.*	0,60—1
— „ *var. mitis Wallr. f. upsaliensis h.*	
— „ *pendula h. = Elise Rathke*	
— „ *var. Sieversii Ledeb. f. tatarica h.*	
— „ *f. viscosa h.*	
— *(microcarpa Carr.) var. ampla Carr.*	
— „ „ *flavescens Carr.*	
— „ „ *flore pleno Carr.*	
— „ „ *intermedia Carr.*	
— „ „ *lutescens Carr.*	0,50—1
— „ „ *nigra Carr.*	
— „ „ *oblonga Carr.*	
— „ „ *ornata Carr.*	
— „ „ *serotina Carr.*	
— „ „ *translucens Carr.*	

Wir führen und offeriren diese „neuen“ *Pirus Carrières*, gleich wie wir es mit Arten *Gandoger's* machen würden, nicht aus dendrologischen, sondern aus pathologischem Interesse und übernehmen keinerlei Verantwortung, falls unsere Abnehmer darunter alte Bekannte finden.

— c) Quitten.

— *Cydonia L. var. taurica h.*	
— „ „ *pyramidalis h.*	
— *japonica Thunb. f. alba grandiflora h.*	
— „ „ „ *albo-cincta h.*	
— „ „ „ *Aurora h.*	
— „ „ „ *atrococcinea plena h.*	
— „ „ „ *eximia h.*	0,70—1
— „ „ „ *flore roseo pleno h.*	
— „ „ „ *lutea macrantha h.*	
— „ „ „ *macrocarpa h.*	
— „ „ „ *sanguinea plena h.*	
— „ „ „ *sarmentosa h.*	
— „ „ „ *Simoni h.*	
Platanus *orientalis L. f. angulosa h.*	
— „ *foliis variegatis h.*	
— „ *var. vitifolia Spach.*	1,50—3
— *occidentalis L. integrifolia h.*	
— „ *laciniata h.*	

		M.
	Populus *Atheniensis Ludw. f. pendula h. = grandidendata pendula*	1—2
	— *balsamifera L. var. heterophylla h.*	0,60—1
	— *balsamifera var. suaveolens* × *nigra pyramidalis* . .	1—1,50
	— *canadensis Mnch. f. grandifolia h. bot.*	
	— „ „ *marylandica h.*	0,60—1
	— „ „ *Medusae h.*	
	— *nigra L. var. betulaefola Wesm.*	
	Potentilla *floribunda Prsh.*	0,40
	— *fruticosa L. var. nana Rgl.* Zwergform von Altai . .	0,80
	— *parvifolia h.*	0,50
	— *spec ignota h.*	0,60
	Prunus. a) Aprikosenbäume.	
	— *Armeniaca L. foliis medio-flavis h.*	
	— „ *flore pleno h.*	
	— „ *f. salicifolia h.*	0,75—1
	— „ *f. spontanea Bucharica*	
	— „ *f.* „ *sibirica*	
	— **b) Pflaumenbäume.**	
	— *Americana Mrsh. var. Californica h. = mollis Torr.*? .	0,80
	— *cerasifera Ehrh. v. gigantea h.*	
	— „ *var. divaricata Ledeb. f. pendula h.*	0,60
	— *insititia L. f. pyramidalis*	
	— „ „ × *spinosa L.* Bastardform aus den Karpathen. In Nord-Ungarn von Herrn Pfarrer Kmet aufgefunden und freundlichst mitgeteilt	1
	— *italica Borkh. flore pleno h.*	1—1,50
	— *Kelsey*? Unter diesem Namen erhielten wir eine sehr auffallende, dem *Amygdalus Simoni* in der Belaubung ähnliche Form japanesischem Ursprungs (Fruchtsorte?) . .	1,50
	— *monticola C. Koch*	1,50
	— „ *hort. nec Koch*	1
	— **c) Kirschbäume.**	
	— *acida Dum. f. umbraculifera h.*, Halb- u. Hochstämme .	1
	— „ „ *f. sub spontanea turkestanica Arb. Zoesch.*, Samen durch Dr. E. Regel erhalten	2
	— *Avium L. f. nana h.*	0,50—1
	— *Cerasus L. flore pleno et foliis variegatis h.*	0,80
	— „ *Lannesiana h.*	0,80
	— „ *f. spontanea turkestanica Arb. Zoesch.* Samen durch Dr. E. Regel erhalten	2
	— *fruticosa Pall.* (*f. erecta h.*) aufrechte typische Form der Erdweichsel	1
	— *emarginata Walp. v. mollis Brew.*	0,75—1,50
	— *japonica Thunb. floresemipleno h.*	1
	— *Mahaleb L. foliis medio aureis h.*	0,80
	— **d) Traubenkirschbäume.**	
	— *Padus L. f. Alberti h.*	1
	— „ *f. aurea h.*, sehr schön broncefarben	1,50
	— *Grayana* Nordwestamerikanische neue Art, die zwischen *Pr. virginiana* und *Pr. demissa* steht. Noch nicht im Handel Samen vom Petersburger bot. Garten erhalten	2
	— **e) Kirschlorbeer.**	
BB	— *caroliniana Michx.*, schön, aber sehr zart	2,50
BB	— *ilicifolia Nutt.*, sehr interessante californische Art . . .	3
B	— *japonica* sehr schmalblättrig und daher auffallend . . .	1,50
B	— *Laurocerasus L. f. Bertini h.*	
B	— „ „ *Bernardi h.*	0,80—1,50
B	— „ „ *microphylla h.*	
B	— „ „ *Otites h.*	
	Ptelea *trifoliata L. foliis variegatis*	1—1,50
	— „ „ „ *aureis*	2

		M.
B?	**Pterocarya** *dumosa Lavallé.* Eine sehr schöne, fein belaubte und niedrig bleibende Busch-Flügelnuss, als Solitair vorzüglich!	0,75—1
	Quercus. a) der alten Welt.	
B?	— *Aegilops L. = Ballota h.*	1
B	— *Mirbeckii Dur.*	1
	— *Robur L. var. apennina Lam.*	1
	— „ „ *brutia Ten.*	1
	— „ *f. pyramidalis Sieboldii h.*	1,50—2
	— „ *f.* „ *cucullata h.*	1,50—2
	— *sessiliflora Salisb. var. iberica Stev.*	1
	— „ „ *var. ventricosa h.*	1
	— „ „ *foliis crispis h.*	1
	— *dentata Thunb. var. Daymio Sieb.*	3
B	— *serrata Thunb.*	3
	— **b) der neuen Welt.**	
	— *cuneata Wangenh. f. hudsonica h.*	2
	— *coccinea Wangenh. f. pendula h.*	2
	— *ferruginea Mchx.*	1,50
	— *macrocarpa Mchx. var. Brioti h.*	1,50
	— „ „ „ *Fischeri h.*	2
	— „ „ „ *monstrosa h.*	2
	— *Prinus L.? f. paludosa h.*	2
	Rhamnus *alnifolia l'Her. f. franguloides Mchx.*	1,50—2
	— *americana h.* zu *lanceolata Prsh.?*	1,50
	— *alpina L. foliis aureo-marginatis h.*	1,50
B?	— *californica Eschsch.*	1,50
	— *frangula L. f. asplenifolia Arb. Musc.*, eine überaus zierliche Neuheit	3
B	— *incisa*, sehr schöne immergrüne Art, aus dem Mündener Arborete erhalten	1,50
B	— *oleoides L.*	1,50
	— *pumila L.*, sehr selten	3
	— *Purshiana f. angustifolia Arb. Zoesch.*	2
	— *spec nova* von Kulab, aus Samen gezogen, den wir durch Dr. E. Regel erhielten	3
	Rhododendron *brachycarpum G. Don.*, harte japanesische Art, noch in Finnland Freilandspflanze! Von Dr. E. Regel erhalten	8—9
	— *ferrugineum × hirsutum = intermedium Tausch.*	3
	— *ponticum L. foliis argenteo-marginatis h.*	3
	— „ *var. imbricata h.*, sehr schön	3—5
	— „ „ *maxima h.*	3—3
	Rhodotypus *Yeddohamae h.* wenig verschieden von *R. kerrioides.*	0,75
	Rhus *cotinus L. f. atropurpurea h.*	2
	— *lobata Hook.*	1,50
B	— *succedanea L.*	1
	— *Toxicodendron L. v. radicans (L.) Giftsumach*	1
	— *venenata DC.*	1,50
	Ribes *alpinum L. f. florida h.*	0,60
	— „ „ *laciniata h.*	0,60
	— „ „ *microphylla Lge.*	1
	— „ „ *opulifolia h.*	0,60
	— *bracteosum Dougl.* prachtvolle Species aus Vancouver	1,50
	— *caucasicum Bieb. = Biebersteini Berl.*	0,80
	— „ „ *f. macrobotrys*	0,80
	— *fulvum h.* zu *alpinum?*	0,60
BB	— *Gayanum Wlpr.*, zarte chilenische Art	1
	— *gracile Mchx.*	0,80
B	— *integrifolium*, immergrüne chilenische Art, aus Münden erhalten	1
B?	— *Lobbii Gr.*, eine neue, zarte, westamerikanische Art, die wir aus Originalsamen zogen	1

	M.
Ribes *nigrum L. f. altaica h.*	0,50
— „ „ „ *foliis variegatis h.*	0,60
— „ „ *var. mollis h.*	0,50
— *rubrum L. var. acerifolia h.*	0,50
— „ „ *f. acutiloba h.*	0,50
— „ „ *f. pubescens h.*	0,50
— *sanguineum Pursh. f. angustifolia h.*	0,60
— „ „ *f. atrorubens*	0,60
— „ „ *f. Fontenaysii*	0,60
— „ „ *f. glutinosa*	0,60
— „ „ *splendens*	0,60
— *saxatile Poll. f. inermis h.*	0,50
— *subvestitum Hook. et Arn.*	0,80
Robinia *Pseudo-Acacia L. var. amorphaefolia h.*, äusserst robust und starkwüchsig	0,80—1,50
— *Pseudo-Acacia f. jaspidea h.*	0,60—1
— „ „ *var. sophoraefolia h.*	0,60—1
— „ „ *var. microphylla h.*	0,60—1
— „ „ *var. umbraculifera vera h.* Hochstämme	1—2
— „ „ „ *obscura h.* „	1—2
— „ „ „ *foliis varieg. h.* „	1—2
— „ „ „ *Rhederii Arb. Musc.*	1—2
— *glutinosa Sims. f. alba h. = albiflora h.?*	0,60—1
— „ „ *f. horrida h.*	0,60—1
Rosa[1]) *acicularis Lindl.*	0,50
— „ „ *v. Bourgeauiana Crép.*	0,80
— „ × *rugosa h. b. Petr.*	0,60
— „ × *cinnamamea Arb. Mund.*	0,60
— „ × *blanda* (?) *h. b. Petr.*	0,60
— *agrestis Savi v. arvatica Chr. = R. sepium Thuill. v. arvatica*	0,60
— *alba L. f. proxima typo*	0,60
— *Alberti Rgl. (ad pimpinellifolias) sp. nova adhuc rarissima*	1,50
— *albida Kmet. (typus)* }	
— „ „ *f. heterocarpa Borb.* } *pulcherrimae*	0,75
— „ „ *f. patens Kmet.* }	
— „ „ *f. Schemitziensis Kmet.* }	
— *alpestris Rap. = canina × alpina?*	0,60
— *alpina L. (pendulina)* }	
— „ *f. adenosepala Borb.* }	
— „ *f. adenophora W. Kit.* }	
— „ *f. coccialba Kmet.* }	
— „ *v. macrocarpa = R. spinulifolia var.* }	
— „ *v. partheniodora Kmet.* }	
— „ *f. petiolata Kmet.* }	
— „ *v. pyrenaica Gouan.* }	
— „ *(pendulina) v. Monspeliaca Gouan.* }	
— „ „ *f. pubescens Kmet., ramulis glandulosis* }	
— „ *f. semisimplex Borb.* }	0,60
— „ *v. setosa Gouan.* }	
— „ *f. stenodonta Borb.* }	
— „ *f. subinermsis Bess.* }	
— „ × *spinosissima = R. gentilis Strub.* }	
— „ „ *var. ex h. b. Romano* }	
— „ „ *= R. rubella Sm. v. ochroleuca* }	
— „ „ „ *v. recurva fl. roseo* }	
— „ × *tomentosa = R. vestita latifolia Chr.* }	
— „ *f. adenosepala × spinosissima = R. reversa W. Kit.* }	
— „ „ „ *f. celsior Kmet. (nova!)*	0,80
— *amoena Kern.*	0,60

[1]) Da die Wildrosen mit ihren zahlreichen Abänderungen in erster Linie nur Botaniker interessiren, so sind die wenigen erklärenden Bemerkungen des internationalen Verständnisses halber in lateinischer Sprache ausgedrückt worden.

	M.
Rosa *Annomiana Pug. (teste Braun.)*	0,60
— *Arduennensis Crép.*	0,60
— *arvensis L.*	0,60
— „ *v. repens Chr. = R. repens Scop.*	0,60
— „ „ *f. baldensis Kern.*	0,60
— „ × *gallica = hybrida Schleich ex h. b. Berol.*	0,75
— *australis Kern.*	0,60
— *Baicalensis Arb. Musc., (ad caninas)*	0,50
— *balsamea W. Kit. f. Placnikensis Kmet.*	0,60
— *Beggeriana Schrenk. = Regelii Reut.*	0,50
— „ *v. nigrescens Schrenk.*	0,50
— „ *fruct., rubro minimo Arb. Zoesch.*	0,75
— „ *v. Ezae (?) = Afghanistan yellow hort. angl.*	0,80
— *Borbasiana H. Braun.*	0,60
— *Braunii, Kell. ad involutam Sabiniarum fide Crépin (nova!)*	0,80
— *Bovernieriana Chr.*	0,60
— *Californica Cham. et Schlecht.*	0,60
— „ *f. nana Arb. Zoesch.*	1
— *callophylla hort. (ad caninas)*	0,50
— *canina L. ex p.*	0,25
— „ *L. v. Andegavensis Chr.*	
— „ *v. Bellevalis Pug.*	
— „ *v. biserrata Chr. = R. biserrata Mér. typus*	
— „ *f. squarrosa R. (forsan subf. gigantea Kmet.)*	
— „ *? v. cordifolia Rgl. e Turkestania*	
— „ *f. foliolis valde attenuatis Arb. Mund.*	
— „ *dumalis Bechst.*	
— „ „ *f. spuria Pug.*	
— „ *var. exilis Crép. (formagracillima!)*	0,50
— „ „ *firmula Chr. = R. firmula God.*	
— „ „ *falcata Pug.*	
— „ „ *glaberrima Chr. f. milledendata Lag.*	
— „ „ *globularis Frauch., Chr.*	
— „ „ *hispidula Rip.*	
— „ „ *hispidissima Chr.*	
— „ *f. e. Turkestania*	
— „ *f. foliis caerulescentibus Arb. Mund.*	
— „ *v. Lutetiana Chr.*	
— *capnoides Kern.*	0,60
— *carelica Fries (species rarissima borealis)*	1
— „ *var. glandulosa Rgl.*	0,80
— *carolina L.*	0,30
— „ × *rugosa Arb. Mund.*	0,75
— *caryophyllacea Bess.*	
— „ *f. floribus dilute roseis Kmet.*	
— „ *f. byssina Kmet.*	0,60
— „ *f. flavescens Kmet.*	
— „ *f. fructibus globosis Kmet.*	
— „ *f. Zalana Wiesb.*	
— *caucasica M. B. ex h. b. Petr. (ad tomentellas)*	0,60
— *Cavallii Kmet.*	0,75
— *Chabertii Déségl.*	
— „ *f. gracilior Kmet.*	0,60
— „ *f. inter. R. Chab. et Kosinskyanam Kmet.*	
— *Chavinii Rap.*	
— *Centifolia L. (?) fl. simplice (= gallica?)*	
— „ *v. major fl. pl.*	
— „ *v. minor fl. pl.*	0,50
— „ *v. muscosa fl. roseo semipl.*	
— „ „ *fl. purpurea semipl.*	
— *cinnamomea L. typus, f. spontanea mont. hercyn.*	0,80
— „ *var. persicina h. b. Petr.*	0,60
— „ *f. Fischeri h. Booth*	0,60
— „ *f. glabriuscula h.*	0,60

	ℳ
Rosa *cinnamomea f. majalis h.*	0,40
— „ „ *fl. pleno*	0,50
— „ × *mollissima? Arb. Mund.*	0,60
— „ × *rugosa macracantha h. b. Petr.*	0,60
— „ „ *h. b. Petr..*	
— „ „ *f. nana h. b. Petr.*	0,75
— „ × ♁ *lucida* ♀ *Schroed. i. lit.*	0,75
— *collina Jacq., typus*	
— „ *f. caesia Sm.*	
— „ *f. Déséglisei Borb.*	
— „ *f. Mygindiana H. Br.*	
— „ *f. Nemcensis Kmet.*	0,50
— *coriifolia Fries., f. frutetorum Bess.*	
— „ *f. minutiflora Kell.*	
— „ *f. typica*	
— „ *v. e Turkestania*	
— *corymbifera Borkh.*	0,60
— *cuspidata M. B.*	0,60
— *dahurica Pall.*	0,50
— *decora Kern*	0,60
— *dumetorum Th.*	
— „ *f. ciliata Borb. (fol. subserratis)*	
— „ *f. conglobata H. Br.*	
— „ *f. hirtifolia v. Hontiensis H. Br.*	
— „ *f. implexa Gren.*	
— „ *f. lanceolata Opiz.*	0,50
— „ *f. lapidophila H. Br.*	
— „ *f. leptotricha Borb.*	
— „ *f. pilosa Opiz.*	
— „ *f. platyphylla Chr. = B. platyphylla Rau?*	
— „ *f. Reussii H. Br. (rarissima!)*	1
— „ *f. solstitialis Bess. (fol. pruioso-albidis)*	
— „ *v. obtusifolia Chr. = K. obtusifolia Desv.*	
— „ *trichoneura = R. trichoneura Rip.*	
— „ *v. urbica Chr. = R. urbica Lun.*	0,50
— „ *f. opaca Gren. (ad R. Reuterii inclinans)*	
— „ *f. pedunculis glandulosis more collinearum Kmet.*	
— „ × *repens Arb. Mund.*	0,60
— *erythranta Bor.*	0,60
— *Fedschenkoana Rgl. (ad R. Beggerianam?)*	0,60
— *firma Pug.*	0,60
— *gallica L.*	0,60
— „ *flore pleno*	0,40
— „ *v. Reuteri*	0,60
— „ × *glauca v. myriodonta = R. psilophylla Ran.*	0,60
— „ *fl. pl.* × *setigera = R. de la Grifferaie h.*	0,40
— „ *v. pumila L. f.*	
— „ „ × *Reuteri Arb. Mund.*	
— „ „ × *repens fl. pallido Arb. Mund.*	0,60
— „ „ × *fl. semipleno*	
— *Gizellae Borb.*	
— *glauca Vill.*	
— „ *f. crabronica Kmet.*	
— „ *v. complicata Chr.*	
— „ *v. myriodonta Chr.*	
— „ *f. petiolis valde aculeatis Kmet.*	
— „ *f. petiot. inermibus Kmet.*	0,60
— „ *v. pilosula Chr.*	
— „ *f. Schottiana ex h. b. Ber. (sed cortice brunneo-coerulescente et. aculeis numerosis!)*	
— „ *v. subcanina Chr.*	
— „ *f. cum serratura myriodontae = f. hispida?*	
— *gracilis Woods ad Sabinias!*	1,50

	M.
Rosa *Granensis Kmet. typus*	
— „ *f. sepalis valde glandulosis (Kmet).* . . .	
— „ *f. foliis interd. eglandulosis, subsimpliciter serratis (Kmet)*	0,75
— „ *f. praecipua Kmet.*	
— *glaucescens Wulf. an nov. sp. fide Kmet.*	1
— *glutinosa Siebt. et Sm. = R. dalmatica (spec. spectabilis!)*	1
— *gorenkensis Bess.*	0,60
— *gymnocarpa Nutt. (vera! spec. gracillima!).*	0,75
— *Hawrana Kmet typus*	
— „ *v. paradaysica Kmet.* } *pulcherrimae!*	0,70
— „ *v. phasianica Kmet. (versus vestitam)*	
— *hemisphaerica Kern*	0,60
— „ *fl. pl.*	0,60
— *Heimerlei M. Br. (rarissime)*	0,80
— *hemitricha Rip.*	
— „ *f. opima rubra Kmet.*	
— *holosericea Ser.*	
— *humilis Marsh. = parviflora Ehrh.*	
— „ *aculeis purpur. numerosis Arb. Zoesch. (f. pulcherr.)*	0,75
— „ *f. procumbens ex Arb. Mund. (forma littoralis!)*	0,75
— „ *× rugosa Arb. Zoesch.*	0,60
— *Ilseana Crép. olim (ad rubrifoliam sec. Crép.)*	
— „ *f. coronariae Kmet.*	
— *infesta Kmet.*	
— *incana W. Kit.*	
— „ *f. Kmetiana Borb.*	
— *inodora Fries*	
— „ *f. Briacensis H. Br.*	
— *innocua Rip.*	0,60
— *jundzilli Bess. typus*	
— *jundzilliana Bess.*	
— „ *f. eminens Kmet.*	
— „ *f. minor Borb.*	
— *Kosinskyana Bess.*	
— „ *f. foliis sinpliciter serratis Kmet.*	
— „ *f. versus Ros. Chabertii (Kmet)*	
— „ *f. cimelium Kmet.*	
— *laxa Retz.*	
— *livescens Bess.*	0,80
— „ *f. nova Kmet. i. lit.*	1
— *lucida Ehrh.*	
— „ *v. sorbifolia h.*	
— *lutescens Pursh.*	0,75
— „ *fl. pl.*	0,75
— *lutea Mill.*	0,60
— „ *v. bicolor h-*	0,70
— „ *v. Harrisonii fl. pl.*	0,60
— *Luciae Fr. et Rochbr.*	0,75
— *luporum Kmet.*	0,60
— *Mareyana Borkh. sed aculeis dimorphis ramis pubescentibus*	0,70
— *Malyi Kern. ad alpinas? (spec. pusilla, rara!)*	1
— *micrantha Chr.*	
— „ *v. microphylla (?)*	
— *minutiflora (spec. californica, spectabilis!)*	1,50
— *montana Chaix.*	0,60
— *macrophylla Lindl. f. acuta Crip.*	1
— „ *f. calcuttensis Lge. i. lit.*	1
— *Manettii h. = chinensis ×?*	0,25
— *mollissima Fries.*	
— „ *f. e. Turkestania*	
— „ *v. spinescens Ch. typus*	0,60
— „ *v. Andrezeyowskyi Stev*	

	M.
Rosa *mollissima v. Zabeli Crép. ad coronatam inclinans Arb. Mund.*	0,75
— *mollissima ad alpinam incl. Arb. Mund.*	0,75
— „ *× alpina = R. spinulifolia Chr. typus* . .	0,75
— *montivaga Déségl.*	0,60
— „ *f. floribus intensissime roseis Kmet.* . . .	0,60
— *moschata Mill ex h. Kew.*	0,75
— „ *Mill v. Pissardi Carr.*	0,80
— *multiflora Thunb.*	0,50
— „ *var. fl. pleno*	0,60
— „ *× rugosa = Jwara Sieb.*	0,60
— *Nipponensis Crép.*	0,80
— *nitida Willd*	0,75
— *nitidula Bess. typus*	
— „ *f. Belgradensis Panc.*	
— „ *f. crassicolla Kmet.*	
— „ *f. delitescens Kmet.*	
— „ *f. festa Kmet.*	
— „ *× montivaga (?) Kmet.*	
— *Nutkana Prsl.*	
— *obovata v. Grenieri Sag. = graveolens gren. f. typica Chr.* .	0,50
— „ *f. hispida Sag.*	
— „ *genuina = R. graveolens vacalcarea et thuringensis Gren.*	
— *oenensis Kern.*	
— *oxyacantha M. B.*	
— *Perrieri Sag. f. Nedolii Kmet.*	
— *petrella Kmet.*	
— *platyacantha Schrenk.*	0,60
— *pisocarpa A. Gray (vera!)*	
— „ *f. fructibus oblongis Arb. Zoesch.*	0,50
— *podolica Bess.*	
— *Pokornyana Kmet = (Ilseana × spuria)*	
— *Principis Kmet*	0,75
— „ *f. aculeis dislocatis Kmet.*	0,80
— *pomifera Herm.*	0,40
— „ *v. proxima Cott.*	0,60
— *provincialis ex h. bot. Panorm.*	0,60
— *praecore Chr.*	0,60
— *pruinosa Lindl.*	0,70
— *pycnantha Borb.*	
— *rubiginosa L.*	
— „ *v. calvescens Chr.*	
— „ *v. altaica h. b. Petr.*	
— „ *v. comosa Chr. = R. comosa Rip = silvestris odorata Don.*	0,50
— „ *v. decipiens Sag.*	
— „ *v. Gremlii Chr. f. redicta Kell.*	
— „ *v. Seraphini Vis. (= glutinosa? × rubiginosa* .	1,50
— „ *v. Kluckii Bess. f. major*	0,60
— *rubrifolia Vill.*	0,40
— „ *f. inclinata Kern.*	0,60
— „ *var. furana Chr.*	0,60
— *rugosa Thunb.*	0,40
— „ *var. ferox. Meyer (= R. Regeliana Andr. et L.)* .	0,40
— „ *f. flore albo h.*	1
— „ *f. glabriuscula Rgl.*	
— „ *f. latifolia h. b. Ptr.*	
— „ *f. Thunbergiana Meyer*	
— „ *subf. fol. undulatis Arb. Zoesch*	
— „ *f. fl. pl. Zuccarinii (imperatrix septentrionalis)* .	0,60
— „ *f. fl. pl. (Taikoun)*	
— „ *f. Lindleyana Meyer*	
— „ *f. fructibus densissime glanduloso-setosis, foliis angustioribus Arb. Zoesch.*	

	Mk.
Rosa *rugosa f. Kamtschatika Vent. = R. Ventenatiana Meyer*	
— " *f. e. Thibetiana*	
— " × *R. bifera h. fl. pl. = Souvenir de Yeddo*	0,60
— " × *virginiana f. sterilis Arb. Zoesch.*	
— " × *virginiana f. fructibus subpurpureis Arb. Zoesch.*	
— " × *virginiana f. repens Arb. Zoesch.*	
— *Salvanensis d. l. Soie (ad permixtam Déségl.?)*	0,70
— *Sabini Woods var. Wilsoni Boor.*	1
— " *f. Ravellae*	1
— " *v. coronata Crép. typus*	1
— *smeperflorens hort fl. pl.*	
— *sempervirens L.*	
— " *var. scandens Mill.*	0,60
— *sepium Thunb.*	
— " *f. albiflora Opiz*	
— *sericea Lindl. = tetrapetala Rug. in hortis adhuc rarissima!*	2
— *setigera Mchx.*	
— " *fl. pl. h.*	0,50
— *scabrata Crép.*	
— " *f. Belaensis Kmet.*	
— *Simcowiczii Kmet.*	0,60
— " *f. ad reversam Kmet.*	0,75
— *spinosissima L.*	
— " *v. albida h.*	
— " *v. flore albo h.*	
— " *v. " roseo h.*	0,40
— " *v. " semipleno h.*	
— " *v. " luteo pleno h.*	
— " *v. Ripartii Déségl.*	
— " *f. nana Arb. Mund.*	0,60
— " *f. sepalis glandulosis, petalis oblongis, magnis, subrubris Kmet.*	0,50
— " × *alpina var. adenophora = R. Holikensis Kmet.*	0,70
— *spiraearum Kmet. (ad caninas)*	0,60
— *stricta Don.*	
— *subgallicana Borb.*	
— *subglobosa Sm.*	
— *subsystylis Borb. = tortuosa Wierzb. = transsylvanica Schw.*	0,60
— " *proxima typo (Kmet)*	
— *subtrichophylla Borb.*	
— *surculosa Wierzb. ex h. b. Panorm.*	0,70
— *Sytnensis Kmet.*	0,80
— *tomentosa Déségl.*	
— " *f. flaccida Déségl.*	
— " *f. micans Déségl.*	
— " *f. islandica ex Arb. Mund.*	
— " *venusta Scheutz.*	
— *tomentella Sm. (typica Chr.)*	
— " *v. Bakeri Déségl. ex. h. b. Kew.*	
— " *v. bohemica H. Br. = R. densiflora Tausch.*	
— " *v. affinis*	0,60
— " *f. fructibus setosis Arb. Mund.*	
— " *f. " maximis Arb. Mund.*	
— *trachyphylla Rau f. typica Chr.*	
— " *v. Hampeana*	
— *tristis Kern.*	
— *turbinata Ait.? ex. h. b. Berol.*	
— *umbelliflora Sm.*	
— *uncinella Bess.*	
— *vestita God. = solitaria Kmet.*	0,80
— " *f. fructibus maximis Arb. Mund. (forma pulcherrima!)*	1

	M.
Rosa *vestita ad alpinam rediens Arb. Mund. pulcherrima*!	1
— *vinodora Kern.*	0,60
— *Virginiana Mchx. = blanda Ait.*	0,30
— „ *var. pubescens Crép.* (*R. blanda Lindl.*)	0,50
— „ *f. Woodsii Lindl.*	0,60
— „ *f. petalis medio-purpureis ex Arb. Mund. pulch.*!	0,75
— „ *v. glabra Crép.* (*R. fraxinifol. Lindl.*)	0,50
— „ *f. luxurians Crép.*	0,60
— „ *f. cannabifolia h.*	0,50
— „ × *indica Arb. Mund.*	0,60
— „ *v. setigera Crép.*	1
— „ „ *f. arcansana Poir.*	1
— *virgultorum Rf. Briacensis H. Br.*	0,60
— *Wichuraiana Crép.* (*nova*!)	1
— *Wagiana Crép.*	0,80
Rubus Brombeersträucher.	
a) Himbeerartige.	
— *ammobius Focke.*	
— *affinis Wh. et N.*	
BB — *rosaefolius Sm. v. coronarius* schöne Art von den höchsten Gebirgen der Sunda-Inseln die nur unter sehr guter Decke ausdauert. Gefülltblühend!	1,50
— *Idaeus L. f. spontanea* vom Brocken.	
— *nitidus Wh. et N.*	
— *suberectus L. Anders.*	
— *strigosus Mchx.*	
— *sulcatus Vest.*	
— *triphyllus Thbg.* ×? = *parvifolius h. Kew.*	0,75
— „ × *Idaeus* = *trifidus hort nonen*	0,75
b) Hochwachsende Arten.	
— *carpinifolius Wh. et N.*	
— *Lindleyanus Nees.* aus dem Royal-Garten zu Kew erhalten.	
— *ulmifolius Schott. f. corylifolius hort. nonn.*	
— „ „ *f.* vom Mte. San Angelo bei Sorrent. Den Samen erhielten wir d. die Gute des Herrn Sprengel-Portici.	
c) Stark wachsende, langrankende Arten.	
— *chlorothyrsus Focke.*	
— *Danicus Focke.*	
— *hedycarpus Focke var. Armeniaca Focke.*	
— *Jenseni Lge.*	0,60
— *Linkianus Lge.*	
— „ „ *flore albo pleno.*	
— *macrophyllus Wh. et N.*	
— *oreogeton Focke var.*	0,75
— *pyramidalis Kalt.*	
— *radula Wh.*	
— *rhombifolius Wh.*	
— *silvaticus Wh. et N.*	
— *thyrsanthus Focke var. thyrsoideus.*	
— *vestitus Wh. et B. = leucostachys h. Kew.*	
d) Kriechende, wurzelnde Arten.	
— *arenarius h.*	
— *Arrhenii Lge.*	
— *Bellardi Wh.*	
— *egregius Focke.*	
— *glandulosus × caesius?*	
— *plicatus Wh.*	
— *prasinus Focke.*	
— *rivularis P. J. M. et W.*	
— *rosaceus Wh. et N.*	
— *saltuum Focke.*	
— *Schleicheri Wh. et N.*	

Alle Rubus-Formen ohne Preisangabe kosten pro Stück 0,50 M.

		ℳ
	Rubus *Sprengelii Wh.*	0,60
	Ruscus *L. Smilacaceae* Mäusedorn	
B	— *aculeatus L.*	0,80
B	— „ *f. laxa Sm.*	0,80
B	— *Hypoglossum L.*	0,80
B	— *racemosus L.*	0,60
	Salix *acutifolia* ♀ von Moskau	0,60
	— *angustifolia Wulf.* von Moskau.	
	— „ × *stipularis* von Perm.	
	— *amygdalina (vel phylicaefolia)* × *depressa* v. Moskau	0,60
	— *Arbuscula* ♀ *var. foetida Schlechtd.*	0,75
	— „ × *hastata*	0,75
	— „ × *myrsinites*	0,75
	— *aurita L.* ♂	
	— „ ♀	
	— „ *f. spathulata.*	
	— „ × *livida = livescens Doll.*	
	— *daphnoides* × *argentea* × *repens.*	
	— „ × *repens Patzeana Anderss.*	0,60
	— *candicans Willd.*	
	— *caprea L. var. elliptica Kern.*	
	— „ × *depressa Schroed.* von Moskau	0,75
	— „ × *stipularis = acuminata Sm.*	
	— *cinerea* × *acuminata Schroed.*	
	— „ × *viminalis.*	
	— *glauca* ×? von Froebel-Zürich	0,60
	— *grandifolia* ♀	
	— *japonica Lavallei*	0,75
	— *Krausei Anderss.* von Warschau	0,75
	— *lanata L.* von Island	3
	— *Lapponum* ♂ *typus* von den Sudeten	0,60
	— „ ♂ *varietas* „ „	0,60
	— „ *v. major-vel. Lappon.* × *caprea Schroed.* von Waldai	1
	— „ × *viminalis Schroed.* von Moskau	0,75
	— „ × *acuminata Schroed.* „ „	0,75
	— „ × *Arbuscula* „ (= *spuria Schl.?*)	0,75
	— „ × *stipularis = Teplouchovi Schroed.* v. Moskau	0,75
	— „ × „ „ *foliis variegatis*	1
	— *lasiandra Benth. var. lancifolia Bebb.* aus Nordwestamerika. sehr schön	0,75
	— *moschata* aus Persien	0,75
	— *Myrsinites L.* ♂	0,75
	— „ „ *var.* von Tirol, aus dem Müudener Arboret	0,75
	— „ „ *var. glabrescens* „ „ „ „	1
	— *myrtilloides L.* von Perm	0,75
	— „ ♀ „ Tirol	0,75
	— *nigricans Sm. var. hebecarpa.*	
	— „ „ „ *crassifolia.*	
	— „ „ „ *leiocarpa.*	
	— „ „ „ *Moabitica Bolle,* vom Autor gütigst mitgeteilt	0,60
	— „ × *caprea* ♀	
	— *palustris Host. = vestita Wimm.* von Moskau	0,60
	— *phylicaefolia* × *daphnoides-jaspidea = S. macrorhyncha Anderss.*	0,60
	— *polaris Wahlenb.*	2,50
	— *pyrolaefolia* ♂! vom Ural noch nicht in Cultur!	3
	— „ *var. alnoides*	1,50
	— *pyrenaica Gouan* ♂	
	— „ „ *f. macrophylla*	0,60
	— „ „ *f. microphylla*	0,60
	— *purpurea* × *cinerea = Pontederana Willd* von Moskau.	
	— *repens L. var. tenuis.*	

Alle Salix-Formen ohne Preisangabe kosten je nach Stärke 0,40—0,50 ℳ.

		M.
	Salix *rosmarinifolia L. (A. Koch)*	0,60
	— „ *Fries.*	0,75
	— *Schraderiana Wild. = Pontederana W. Koch?* v. Moskau.	
	— *Schatilowi Schroed. (Lappon × purpur.?)* von Tula . .	0,60
	— *stipularis* ♀ × *acutifolia* ♂ = *Sacharowi Schroed.* von Moskau	0,60
	— „ × *viminalis Schroed.*	0,60
	— „ *f. rossica.*	
BB	— *Späthii Koopm. i. l.* zierliche schmalblättrige, aber sehr weichliche Weide aus Turkestan	1,25
	— *viridis Fries.*	0,60
	Salvia *officinalis L. f. latifolia*	0,50
	— *auriculata Mill. = triloba Jacq. f.*	0,60
	Sambucus *glauca Nutt. f. augustifolia h.* aus dem Mündener Arboret	1
	— *melanocarpa Gray*[1] = *pubens hort. nonnull.* . . .	0,75
	— *mexicana Prsl. = Plantierensis hort nonnull.* . . .	0,75
	— *nigra L. fructu luteo*	0,50
	— *racemosa L. fructu flavo*	1
B	**Santolina** *viridis Willd.*	0,60
	Sarcozygium *Bge. Zygophyllaceae*	
B?	— *xanthoxylon Bge.* turkestanischer Wüstenstrauch! noch nicht in den Gärten	3
	Sheperdia *argentea Nutt.* noch sehr selten in den Gärten .	1,50
	Skimmia *japonica Thunb. f. fragrans*	1,50
	Smilax Stechwinde *Smilaceae*	
B?	— *hastata Willd.*	1,25
	— *rotundifolia L. var. caduca L.*	2
B?	— *tamnoides L.*	1,25
B	— *Walteri h.*	2
	Die interessanten Smilax-Arten Amerikas fehlen bisher ganz in den deutschen Gärten, sollten aber, besonders auch in botanischen Gärten, nirgends fehlen. Es genügt im Winter eine leichte Wurzelabdeckung oder Niederlegen der Pflanze.	
B	**Sophora** *japonica L. var. tomentosa h.*	1—2
B	— „ *f. pendula h.* . . . . . . hochstämmig	3—4
B?	— *spec. nova* von Gilgit, Nord-Himalaia	3—4
B?	— „ „ I. aus der Mongolei	3—4
B?	— „ „ II. „ „ „ alle drei Novitäten aus Original-Samen erzogen, welchen wir der Güte des Herrn Dr. E. Regel verdanken.	3—4
	Sorbus *aucuparia L. f. aurea h*, mit schöner goldgelber Belaubung	1—1,50
	— *aucuparia L. var. edulis h.*, Frucht süss und essbar .	2
	— „ „ *var. saturejaefolia*	0,80
	— *Aria Crantz. f. salicifolia hort. Kew.*	0,80
	— „ „ *f. undulata hort. Kew.*	0,80
B?	— *florentina Dcne.*, sehr interessante, seltene, nach *Mespilus* hinneigende Art die wir dem Mündener Arboret verdanken.	3
	— *species* aus Japan (= *alnifolia S. et Z.?*)	1,50
	— *torminalis Crantz*, Elzbeere	0,60—1,50
	— „ *f. major (americana) h.*, aus amerikan. Samen.	0,80—1,50
	Sphaerophysa *WC. Leguminosae*	
	— *Salsola WC*, Wüstenstrauch aus Turkestan, der Salzboden verlangt	1—1,50
B	**Spartocytisus** *junceus L.*	0,50
B	— *purgans Willd.*	1

[1]) Bestimmung zweifelhaft, da Gray seine Art neben *S. racemosa* stellt, während die vorliegende Art der *S. canadensis* verwandt ist. Vielleicht noch unbeschrieben! Mein Sammler in britisch Columbien meldete unlängst das Auffinden einer *Samb. racemosa* mit dunkelbraunen Früchten, welche vielleicht die echte *S. melanocarpa* ist.

		M.
	Spiraea *L.*[1]) *subgen. Chamaedryon*	
	— *cana × superhypericifolia (Zabel) = cinerea var. superhypericifolia Zab.*	1
	— *Chamaedryfolia L. var. alnifolia h.*	0,60
	— „ *var. ulmifolia Scop. f. Jacobseni Lge.*, vom Autor gütigst mitgeteilt	0,80
	— „ *var. ulmifolia f. latifolia h.* . . .	0,60
	— „ *f. subintegra Zab.*	0,80
	— *crenata × cana = inflexa h.*	0,60
	— „ *f. gracilis h.*	0,60
	— *hypericifolia L. f. nana h.*	0,60
	— „ „ *f. thalictroides Pall.*	0,60
	— „ *× media Arb. Zoesch.*	1
	— *media Schm. var. mollis Rgl.*	0,60
	— „ „ *var. confusa Rgl. f. incisa h.*	0,60
	— *mongolica Maxim.*, neue, sehr zierliche Zwergart . .	1,50
	— *longigemmis Maxim.*, sehr schön belaubte, neue Art, die bei uns gleich der vorhergehenden aus mongolischem, vom Petersburger Garten gesandten Samen erwuchs . .	2
	subgen. Spiraria.	
	— *betulifolia × salicifolia = aemula Zab.*	1
	— „ *× japonica (Zabel)*	1
	— „ *× Douglasii (Zabel)*	1
	— *Douglasii × superba (Zabel)*	1
	— „ *× salicifolia? = Constantiae Schroed.*, vom Züchter gütigst eingesandt	1
	— *expansa Wall. ×? = amoena hort. nonnull.* . . .	0,60
	— *japonica × superba = Margaritae Zab.*, die schönste der Hybriden dieser Klasse!	1—1,50
	— *leucantha Lge.*, vom Autor gütigst mitgetheilt (zu *albiflora*)	1—1,50
	— *salicifolia var. latifolia Borkh.*	0,50
	— „ „ „ *× expansa = brumalis Lge.*, eine sehr interessante, reichblühende und üppig wachsende Bastardform, die uns der Autor gütigst aus Kopenhagen einsandte	1
	— *salicifolia × tomentosa (Zabel)*	1
	— *superba × notha (Zabel)*	1
	— „ *× conspicua (Zabel)*	1
	— *superbetulifolia × salicifolia (Zabel)*	1
	— *tomentosa × salicifolia = pallidiflora Zab.* . . .	1
	Stuartia *Lin. Ternstroemiaceae*	
B	— *grandiflora Sieb.*, botanische Seltenheit	5
B?	**Styrax** *japonica S. et Z.*	2,50
	Symphoricarpus *mollis Nutt.*, aus Samen erzogen, den Herr Dr. Heyer für uns in Californien sammelte . . .	1,25
	— *longiflorus Gray*, eine sehr zierliche, kleinblättrige Art, welche in den Gärten öfter als *Lonicera vaccinifolia* sich findet	0,80
	— *occidentalis Hook.*, aus Samen erzogen, den mein nach Nordwestamerika entsandter botanischer Sammler einsandte[2])	1,25
	— *racemosus Mchx. var. pauciflora Robb. = S. montanus hort. nonn.*	0,75
	Syringa *pubescens Turcz.*, aus Nord-China, noch sehr selten in den Gärten!	2
	— *villosa Vahl.*, aus Nord-China, noch sehr selten in den Gärten!	2
	— *vulgaris L.*[3]) *f.*, Andenken an *L. Späth.*	1,50
	— „ „ *f. Bertha Dammann*	1,50
	— „ „ *f. Charlemagne*	0,80
	— „ „ *f. citriflora*	0,80

[1]) Sämmtliche hier geführte Zabel'sche Novitäten und Züchtungen vom Autor erhalten.

[2]) Wir erhalten von dort auch eine neue, kriechende Art mit lebhaft rothen Blüthen.

[3]) Eine unzweifelhaft spontane Gebirgsform unseres Flieders sammelte dieses Jahr unser Balkansammler auf den höchsten Felsen des Ozan-Balkan und hoffen wir, dieselbe später zunächst den botanischen Gärten offeriren zu können.

		M.
	Syringa *vulgaris L. f. gigantea*	
	— „ „ *f. Liberti*	
	— „ „ *f. Princess Marianne*	
	— „ „ *f. serotina*	0,80
	— „ „ *f. spectabilis*	
	— „ „ *f. versaliensis*	
	— „ „ *f. violacea flore pleno*	
	Tamarix *tetrandra var. caspica Pall.*	0,75
	Tecoma *radicans L. f. coccinea*	0,75
	Teucrium *cyaneum h.*	
	— *hyrcanicum*	
	— *lucidum L.*	0,50
	— *Massiliense L.*	
	— *montanum L.*	
	Tetranthera *Jacq. Laurineae*	
B	— *californica,* botanische Seltenheit	3—4
	Thymus *lanuginosus Mill. foliis variegatis*	
	— *montanus W. Kit. var. alba.*	
	— *Serpyllum L. f. repeus h.*	0,50
	— *strictus Wahl.*	
	Tilia *americana L. f. glabra Vent.*	
	— „ *f. leptophylla*	
	— *alba Ait. f. spectabilis h.,* sehr starkwüchsig	
	— „ „ *f. Parmentieri pendula h.*	0,80—2
	— *platyphyllos Scop. f. Beaumontea h.*	
	— „ „ *f. corallina h.*	
	— „ „ *var. obliqua*	
	— „ × *vulgaris*	
B	**Ulex** *parviflorus Pourr.*	0,75
B	— *Welwitschianus Pl.,* botanische Seltenheit!	1
	Ulmus *campestris f. alata h.*	
	— „ *f. alba h.*	
	— „ *f. betulinoides*	
	— „ *f. Escaillardi h.*	
	— „ *f. Huntingdonensis h.,* die starkwüchsigste Feldrüster	
	— *campestris f. fungosa*	
	— „ *f. rufa*	0,60—1,50
	— „ *f. Sarniensis*	
	— „ *f. Scamstonii*	
	— „ *var. turkestanica f. Koopmanni,* Kugelulme	
	— „ *f. tortuosa*	
	— *scabra Mill. f. flava*	
	— „ „ *f. modiolina*	
	— „ „ *f. tiliaefolia*	
	Ungnadia *Endl. Hippocastaneae*	
B	— *speciosa Endl.*	1
	Vaccinium *Myrtillus L. fl. albo*	1,50
	— *ovatum Prsh.*	1,50
	Viburnum *asiaticum (Wall.?) h.*	1
	— *dentatum L. v. longifolia h.* an *spec. distincta?*	1
	— *Nepalense h.*	1
	— *prunifolium L. f. pirifolia Poir. fol. var.*	1,50
B	— *ordoratissimum Ker. = Awafuski Lindl.*	2
B?	— *Sieboldi Micq. = reticulatum Sieb.*	1
B	— *suspensum h.*	1,50
B?	**Vinca** *acutiflora Bert.* zu *media Hofgg.?*	0,80
	— *herbacea*	0,40
	Vinca *major L. f. flavida*	0,30
	— *minor L. foliis aureo-maculatis*	0,30
B	**Vitex** *angustifolia h.*	0,60
B	— *agnus castus L. f. caerulea h.*	0,60

		ℳ.
B	**Vitis** *aegyrophylla Boiss.*, aus turkestanischem Samen, den ich von Dr. Regel erhielt	2
	— *himalaiensis h.*, aus Samen, den mir Dr. Regel aus dem Material der russischen Gilgit-Expedition überliess . .	3
	— *indivisa W.* = *cordata Mchx.?*	1
B?	— *quinquefolia L. f. muralis h.*	1
B	**Wistaria** *Sieboldi h.* = *japonica S. et Z.?*	1,50

Sortiments-Offerte

nur bei zeitiger Herbstbestellung lieferbar.

A. Gemischte Sortimente.

Das erste Tausend Sorten in ebensoviel Exemplaren	ℳ.	500
„ zweite „ „ „ „ „	„	650
„ dritte „ „ „ „ „	„	800
„ vierte „ „ „ „ „	„	1000

B. Pflanzengeographische Sortimente.

	à ℳ.
1. Circumpolares, arctisches Gebiet	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,50
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,80
2. Antarctisches Gebiet incl. Neuseeland und Süd-Chile	
bis 25 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	1
3. Orientalisches Gebiet (von der Balkanhalbinsel bis zum Kaukasus und Elbrus)	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,50
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,80
4. Mittelmeergebiet	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,50
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,80
5. Centralasiatisches Gebiet (vorwiegend Steppengebiet)	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,60
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,90
6. Ostasiatisches Gebiet (China und Japan)	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,60
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,80
„ 300 „ „ „ „ „ „	1
7. Nordamerik. Gebiet der Ost- und Centralstaaten (incl. Präriegebiet)	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,50
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,60
„ 300 „ „ „ „ „ „	0,80
„ 400 „ „ „ „ „ „	1
8. Nordamerik. Pacificgebiet (incl. Britisch Südwest-Columbien)	
bis 100 Arten und Varietäten in ebensoviel Exemplaren	0,60
„ 200 „ „ „ „ „ „	0,80
„ 300 „ „ „ „ „ „	1

Bestellungen auf geographische Sortimente sind während der Sommermonate aufzugeben und ist uns freizustellen, die Gesammtlieferung zusammen im darauffolgenden Frühjahr oder getheilt im Herbst und Frühjahr auszuführen. Die obigen Preise haben nur Gültigkeit, sobald die Sortimente ohne jede Ausschliessung bestellt werden. Soweit der Vorrath es irgend gestattet, werden nur kräftige Pflanzen geliefert.

C. Botanische Park-Sortimente.

Arten und Novitäten von botanischem Interesse und nur selten oder bisher gar nicht in den Anpflanzungen verbreitet.

1000 Stück in mindestens 200 Sorten, stärkste Qualität . . . . . ℳ 450
100 „ desgl. in mindestens 30 Sorten . . . . „ 50

Diese Park-Sortimente eignen sich besonders für öffentliche Gärten, welche gleichzeitig wissenschaftliches Interesse verfolgen und doch ein starkes Pflanzenmaterial haben müssen.

II. Obstgehölze.

Alle aufgeführten Sorten sind nur erst in 1—2jähriger Vermehrung vorhanden.

A. Aepfel.

		ℳ
*††	**Belle de Pontoise**, prächtig gefärbter Riesenapfel von reichlich 25 cm Fruchtumfang, wohlschmeckend. December—Januar	1,50
**††	**Cellini**, ansehnliche, werthvolle Sorte	1
**††	**Daru-Apfel**, schöner ungarischer Winterapfel, gross, gut und haltbar. Nov.—März	1,50
*††	**Ivanhoe**, bleibt bis zum Juni saftig und wohlschmeckend	1,50
	Leconte, Lehnhoffs Reinette, Luxemburg Reinette	1
*††	**Morgenduft-Apfel**, früh und reichtragend. Dec.—Mai	1
	Prinz Albert, Sherwoods Liebling, Wellington-Apfel	1
*††	**Sabaros**, stammt von der Insel Ré und erträgt die Stürme, da er mehr strauchartig wächst und sich aus Ausläufern vermehrt. Die hellen Früchte sind nur mittelgross, das Fleisch ist fest und säuerlich. Für die deutschen und besonders die Nordseeküsten gewiss eine werthvolle Aquisition. Nov.—April.	2

Russische Sorten für kälteste Lagen. à 1 ℳ

*†† **Antonowka.** Nov.
*†† **Aport.** Nov.—Jan.
*†† **Borowinka.** Nov.—Febr.
†† **Plodowitka. Sept.—Oct.
*† **Serjanka.** Oct.—Nov. (Küstenapfel).
*†† **Tschernoje Derowo.** Nov.—Jan.
*†† **Borkowskoje.** Aug.—Sept.
** **Kalwil krasny betny.** Sept.
† **Karitschnewoje. Aug.—Sept.
† **Titowka. Sept.—Oct.
*†† „ weisser. Aug.

B. Birnen.

		ℳ
**†	**America.** Nov.—Dec.	1
	Butterb., Graf Hollers gerippte	1
	„ **Schönleins Stuttgarter**	1
**†	**Directeur Alphand**, eine der grössten u. feinsten Tafelbirnen. Febr.—April.	2
	Duchesse d'Angoulème panachée	1
*††	**Lehou-Grignon**, eine der besten neuen Winterbirnen. Febr.—April.	1,50
†?	**Mikado**, diese augenscheinlich von „Pirus ussuriensis“ abstammende japanische Sorte ist zwar fast ungeniessbar, aber durch die platte Form der Frucht sehr merkwürdig	1
**††	**Minister Dr. Lucius**, sehr feine und sehr grosse Frucht (der Baum bildet schöne Pyramiden). Oct.—Nov.	1,50
†?	**von Siebold**, von dieser Birne gilt annähernd das von der Mikadobirne gesagte, aber die Form ist länglich	1

C. Kirschen. à 0,75 M.

Herzkirsche, frühe spanische.
„ Spitzers schwarze.
„ Doctorkirsche.
Knorpelkirsche, frühe von Werder.
„ späte von Hildesheim.
„ „ von Meiningen.
„ schwarze von Guben.
Knorpelkirsche, schöne von Charneux. Juli.
„ Rigikirsche. Ende Juli.
Amarelle von Chatenay.
„ langstielige von Montmorency.
„ Herzogin von Angoulême.
Weichsel, schöne, extra von Brüssel.

D. Edelpflaumen. à 0,75 M.

Coës golden drop.
Mirabelle, frühe.
„ von Metz.
Malasse.
Herrenpflaume, frühe.
Eierpflaume, grosse blaue.
„ grosse gelbe.
The Czar.
Reneclode-Althann's.
Zwetsche, gelbe Reitzensteiner.
„ grosse gelbe Dattel.
„ frühe Esslinger.
„ „ von Lucas.
„ ungarische, Muscat.

Central- und westasiatische, meist Apricosen ähnliche à 1 M.

Alibuchara, gelbe.
Arik Alutscha.
Alutscha, späte.
„ weisse späte.
Agh. Ali.
Wisir Ali.
Kelsey (japanische Pflaume).

E. Pfirsiche. à 2,50 M.

Downing, schöne rothe Frühpfirsiche.
Präsident Griepenkerl, schön u. winterhart.
Nana Aubinal, Zwergsorte für Topfkultur. 3 M.

F. Apricosen. à 2 M.

Deegens späteste.
Souvenir d'Amic, grosse frühe Marktfrucht.

G. Haselnüsse. à 0,60 M.

Apolda-Nuss. 1 M.
Barceloner von Guben.
Barr's spanische.
Badem Funduk.
Belle de Giubilino.
Downtons, lange.
Frizzled Trapezunter.
Gilberts Lambert.
de Beyne.
Funduk.
„ **Trapezunter.**
Frühe, einzeltragende.
Fertile de Pearson.
Precoce de Grugliasco. 1 M.
Rudolfi's Nuss.
Wally's Nuss.
Zellernuss, Blumenberger.
„ Bernhardts.
„ Gustavs.
„ Kircheisens.
„ von Truchsess.
Webbs price cob Filbert. 1 M.

Die meisten erst nächstes Jahr abgebbar.

H. Johannisbeeren. à 1 M.

Cerise incomparable.
„ **Merveilleuse.**
„ **Progrès.**
„ **Seraphine.**
Attractor.
Ruhm von Haarlem.
Fox's new red.

I. Brombeeren. à 0,60 M.

Agawam. 1 M.
Dorchester.
Hoosac's thornless. 1 M.
Knox.
Miners trailing.
Stones hardy. 1 M.
Snyder. 1 M.
Western triumph. 1 M.

In Folge häufig einlaufender Anfragen nach geeigneter periodischer Literatur, erlaube ich mir zu bemerken, dass von gärtnerisch botanischen Zeitschriften die wissenschaftlich am höchsten stehende die bei Parey erscheinende **Regelsche Gartenflora** ist, während für die grosse Menge der Gärtner die in München erscheinenden **Illustrirten Monatshefte** von Max Kolb und Dr. J. E. Weiss, sowie die **Deutsche Gartenzeitung** zu Berlin besondere Beachtung verdienen. Die am besten redigirte Obstbau-Zeitschrift der Neuzeit dürfte schliesslich **N. Gaucher's praktischer Obstbaumzüchter** sein (Stuttgart bei A. Jung).

Was die botanischen Expeditionen betrifft, von denen viele meiner Herren Correspondenten zu hören oder an dem Ergebniss sich zu betheiligen wünschen, so bemerke ich Folgendes:

Die Balkanexpedition hat einen quantitativ zu unerheblichen Ertrag gegeben, trotz sonst hochinteressanter und werthvoller Ergebnisse. Ich sehe daher davon ab Sämereien etc. schon jetzt zu offeriren, und werde später das fertige Pflanzenmaterial anbieten.

Die Ausbeute der von mir nach Nordwest-Amerika und besonders Britisch Columbien entsandten, naturwissenschaftlichen Expedition gelangt im Frühjahr 1888 zur Vertheilung. Es sind mir bereits ansehnliche Mengen der interessantesten Dinge, besonders auch ein reiches Sortiment Samen z. Th. neuer oder in Deutschland noch nicht eingeführter Gehölze und Pflanzen zugegangen oder annoncirt. Ich erwarte auch grössere Posten von Samen der Douglasfichte und anderer edler Waldbäume Columbiens aus rauher nördlicher Lage, so dass die Acclimatisation sich weit leichter erreichen lassen wird, als mit dem amerikanischen Saatgute aus dem italienischen Klima Oregon's und Californien's. Den Herren Interessenten stehen später gern Spezialofferten zu Diensten und zwar nicht nur über Sämereien, sondern auch über Centurien von Herbarpflanzen, Insekten aller Ordnungen, Fossilien, ethnographische Gegenstände u. s. w.

Dr. G. Dieck.

Halle, Druck von Ehrhardt Karras.